



BESTANDSSPEZIFISCHE IMPFSTOFFE

Indikationen bei Rindern

Erkrankung	Erreger	Probenmaterial
Durchfallerkrankung	<i>Clostridium perfringens</i> <i>E. coli</i> <i>Salmonella</i> spp.	Kot, Kottupfer in Transportmedium, Darm
Atemwegserkrankung	<i>Mannheimia haemolytica</i> <i>Pasteurella multocida</i> <i>Histophilus somnus</i> <i>Trueperella pyogenes</i> <i>Mycoplasma bovis</i>	Lunge, BALF, Nasentupfer in Transportmedium
Papillomatose	Papillomaviren	Warzenmaterial (sauber, trocken, kein Formalin zusetzen, kein Blauspray verwenden) etwa kirschgroße Menge bzw. 5 g pro 50 ml Impfstoff
Trichophytie	Trichophyten Dermatophyten	Haare und Hautgeschabsel oberflächlich (genügend ausgezupfte Haare vom Rand der Läsionen von unbehandelten Tieren, nicht luftdicht verpackt versenden), ev. Zahnbürste verwenden
Mastitis	<i>E. coli</i> <i>Staphylococcus</i> spp. <i>Streptococcus</i> spp. coliforme Keime <i>Klebsiella</i> spp. <i>Trueperella pyogenes</i>	Milch, sterile Entnahme